

## Colles de la semaine 4. Nom et prénom ?

Questions de cours 1 – (C) = questions de cours, (A) = applications Réponses

Compléter, ou bien cocher la (ou les ) bonne(s) réponse(s).

- Q1. Soit  $z \in \mathbb{C}$ , donner trois conditions nécessaires et suffisantes pour que  $z$  soit réel (dont une relation entre  $z$  et  $\bar{z}$ ) :


(C)  $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow$    $\Leftrightarrow$    $\Leftrightarrow$

puis trois conditions nécessaires et suffisantes pour que  $z$  soit imaginaire pur (dont une relation entre  $z$  et  $\bar{z}$ ) :

(C)  $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow$    $\Leftrightarrow$    $\Leftrightarrow$

- Q2. (C)  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $|e^{ix}| =$   ; (C)  $\forall z \in \mathbb{C}^*$ ,  $|z| = 1 \Leftrightarrow \bar{z} =$  .

- Q3. (A) Placer dans le dessin ci-dessous les nombres  $e^{i\frac{47\pi}{4}}$ ,  $e^{-i\frac{15\pi}{7}}$ ,  $i^{-22}$ , et  $j^{85}$  :



**Q4.** Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$\begin{aligned} (\mathbf{C}) \quad z^n = 1 &\iff \exists k \in \boxed{\phantom{\dots}} \text{ tel que } z = \boxed{\phantom{\dots}} \\ &\iff z \in \left\{ \boxed{\phantom{\dots}} \mid k \in \boxed{\phantom{\dots}} \right\}. \end{aligned}$$

Soit  $\alpha \in \mathbb{C}^*$ ,

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}) \quad z^n = \alpha^n &\iff \exists k \in \boxed{\phantom{\dots}} \text{ tel que } z = \boxed{\phantom{\dots}} \\ (\mathbf{A}) \iff z &\in \left\{ \boxed{\phantom{\dots}} \mid k \in \boxed{\phantom{\dots}} \right\}. \end{aligned}$$

Résoudre dans  $\mathbb{C}$  :

$$\begin{aligned} (\mathbf{A}) \quad z^3 = -1 &\iff z \in \left\{ \boxed{\phantom{\dots}}, \boxed{\phantom{\dots}}, \boxed{\phantom{\dots}} \right\}; \\ (\mathbf{A}) \quad z^4 = i &\iff z \in \left\{ \boxed{\phantom{\dots}}, \boxed{\phantom{\dots}}, \boxed{\phantom{\dots}}, \boxed{\phantom{\dots}} \right\}. \end{aligned}$$

**Q5.** Soit  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ , à l'aide de la technique de « l'argument-moitié » écrire les nombres complexes suivants sous forme  $x \times e^{i\theta}$ , avec  $(x, \theta) \in \mathbb{R}^2$  :

$$(\mathbf{A}) \quad e^{i\alpha} + e^{i\beta} = \boxed{\phantom{\dots}} \times e^{i \boxed{\phantom{\dots}}}; \quad (\mathbf{A}) \quad e^{i\alpha} - e^{i\beta} = \boxed{\phantom{\dots}} \times e^{i \boxed{\phantom{\dots}}}.$$

**Q6. (A)** Écrire sous forme algébrique :  $(1 - 2i)^3 = \boxed{\phantom{\dots}}$ .

**Q7. (A)** Compléter ci-dessous la résolution dans  $\mathbb{C}$  de l'équation

$$2x^2 - (3+i)x + 2 = 0 \iff x \in \left\{ \boxed{\phantom{\dots}}, \boxed{\phantom{\dots}} \right\}$$

car le discriminant de  $2X^2 - (3+i)X + 2$  est

$$\Delta = \boxed{\phantom{\dots}} = \left( \boxed{\phantom{\dots}} \right)^2.$$

## Colles de la semaine 4. Nom et prénom ?

### Exercice 1

Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^2 - 2iz - 1 + 2i = 0$ .

### Exercice 2

Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^2 - (2 + 4i)z - 3 + 2i = 0$ .

### Exercice 3

Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^2 - (2 + 2i)z - 3 + 6i = 0$ .

### Exercice 4

Calculer les sommes  $\sum_{k=0}^n \cos(a + k\theta)$  et  $\sum_{k=0}^n \sin(a + k\theta)$  où  $a$  et  $\theta$  sont des réels, et  $n$  est un entier naturel.

### Exercice 5

Calculer les sommes  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(a + k\theta)$  et  $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(a + k\theta)$  où  $a$  et  $\theta$  sont des réels, et  $n$  est un entier naturel.

### Exercice 6

Soit  $a \in \mathbb{R}$ , écrire  $\cos(5a)$  en fonction de  $\cos a$  et en déduire la valeur, avec des radicaux, de  $\cos(\pi/10)$ , puis de  $\cos(\pi/5)$ .

### Exercice 7

Pour tout réel  $x$ , linéariser  $\cos^4(x) \times \sin(x)$ .

### Exercice 8

Pour tout réel  $x$ , écrire  $\sin(6x)$  en fonction de  $\cos(x)$ .

### **Exercice 9**

Soient  $a$ ,  $b$  et  $c$  trois nombres complexes de module 1, qui vérifient  $ac \neq -1$ .

Montrer que le nombre complexe  $\frac{(c-b)(1+ab)}{b(1+ac)}$  est un imaginaire pur.

### **Exercice 10**

Soit  $z \in \mathbb{C} - \{-1\}$ . Montrer l'équivalence

$$|z| = 1 \iff \exists a \in \mathbb{R}, z = \frac{1+ia}{1-ia}.$$

### **Exercice 11**

Soit  $\omega = e^{i\frac{2\pi}{7}}$ . Montrer que  $\sum_{k=0}^6 \omega^k = 0$ , en déduire la valeur de

$$\cos\left(\frac{\pi}{7}\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \cos\left(\frac{3\pi}{7}\right).$$

### **Exercice 12**

Soient  $\omega = e^{i\frac{2\pi}{7}}$ ,  $S = \omega + \omega^2 + \omega^4$  et  $T = \omega^3 + \omega^5 + \omega^6$ .

1. Montrer que  $S$  et  $T$  sont conjugués et que  $\text{Im}(S) > 0$ .
2. Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $Z^2 + Z + 2 = 0$
3. Calculer  $S + T$  et montrer que  $S.T = 2$ , et en déduire  $S$  et  $T$ .

### **Exercice 13**

Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation

$$\left(\frac{z+i}{z-i}\right)^4 - \left(\frac{z+i}{z-i}\right)^3 + \left(\frac{z+i}{z-i}\right)^2 - \left(\frac{z+i}{z-i}\right) + 1 = 0.$$

## Colles de la semaine 4. Nom et prénom ?

### Réponses aux questions de cours

questions

**Q 1.** Soit  $z \in \mathbb{C}$ ,

$$\begin{aligned} z \in \mathbb{R} &\iff \boxed{\operatorname{Im}(z) = 0} \iff \boxed{z = \bar{z}} \iff \boxed{\arg(z) = 0[\pi]} \\ z \in i\mathbb{R} &\iff \boxed{\operatorname{Re}(z) = 0} \iff \boxed{z = -\bar{z}} \iff \boxed{\arg(z) = \frac{\pi}{2}[\pi]} \end{aligned}$$

**Q 2.**  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $|\mathrm{e}^{ix}| = \boxed{1}$ ;  $\forall z \in \mathbb{C}$ ,  $|z| = 1 \iff \bar{z} = \boxed{\frac{1}{z}}$ .

**Q 3.** Sachant que pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ ,  $\mathrm{e}^{i(2k)\pi} = 1$ , et  $\mathrm{e}^{i(2k+1)\pi} = -1$ , autrement dit que  $\mathrm{e}^{ik\pi} = (-1)^k$ , on écrit

$$\begin{aligned} \mathrm{e}^{i\frac{47\pi}{4}} &= \mathrm{e}^{i(11\pi + \frac{\pi}{4})} = -\mathrm{e}^{i\frac{\pi}{4}} = \mathrm{e}^{i\frac{5\pi}{4}}, \\ \mathrm{e}^{-i\frac{15\pi}{7}} &= \mathrm{e}^{-i(2\pi + \frac{\pi}{7})} = \mathrm{e}^{-i\frac{\pi}{7}}, \\ i^{-22} &= (i^2)^{-11} = (-1)^{-11} = -1, \\ j^{85} &= j^{3 \times 28 + 1} = (j^3)^{28} \times j = 1^{28} \times j = j. \end{aligned}$$

Je vous laisse les placer sur le cercle trigonométrique.

**Q 4.** Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , Compléter :

$$\begin{aligned} z^n = 1 &\iff \exists k \in \boxed{[0 ; n-1]} \text{ tel que } z = \boxed{\mathrm{e}^{ik\frac{2\pi}{n}}} \\ &\iff z \in \left\{ \boxed{\mathrm{e}^{ik\frac{2\pi}{n}}} \mid k \in \boxed{[0 ; n-1]} \right\}. \end{aligned}$$

soit  $\alpha \in \mathbb{C}^*$ , compléter :

$$\begin{aligned} z^n = \alpha^n &\iff \exists k \in \boxed{[0 ; n-1]} \text{ tel que } z = \boxed{\alpha \times \mathrm{e}^{ik\frac{2\pi}{n}}} \\ &\iff z \in \left\{ \boxed{\alpha \times \mathrm{e}^{ik\frac{2\pi}{n}}} \mid k \in \boxed{[0 ; n-1]} \right\}. \end{aligned}$$

Résoudre dans  $\mathbb{C}$  l'équation  $z^4 = i$  :

$$\begin{aligned} z^4 = i &\iff z^4 = \left(\mathrm{e}^{i\frac{\pi}{8}}\right)^4 \iff \exists k \in \boxed{[0 ; 3]}, \quad z = \mathrm{e}^{i\frac{\pi}{8}} \times \mathrm{e}^{ik\frac{\pi}{2}} \\ &\iff z \in \left\{ \boxed{\mathrm{e}^{i\frac{\pi}{8}}, -\mathrm{e}^{i\frac{\pi}{8}}, i \times \mathrm{e}^{i\frac{\pi}{8}}, -i \times \mathrm{e}^{i\frac{\pi}{8}}} \right\} = \left\{ \mathrm{e}^{i\frac{\pi}{8}}, -\mathrm{e}^{i\frac{\pi}{8}}, \mathrm{e}^{i\frac{5\pi}{8}}, -\mathrm{e}^{i\frac{5\pi}{8}} \right\}. \end{aligned}$$

**Q 5.** Soit  $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ , à l'aide de la technique de « l'argument-moitié » écrire les nombres

complexes suivants sous forme  $x \times e^{i\theta}$ , avec  $(x, \theta) \in \mathbb{R}^2$  :

$$\begin{aligned} e^{i\alpha} + e^{i\beta} &= e^{i\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)} \left( e^{i\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)} + e^{-i\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)} \right) \\ &= \boxed{2 \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)} \times e^{i\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}; \\ e^{i\alpha} - e^{i\beta} &= 2i \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \times e^{i\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)} \\ &= \boxed{2 \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)} \times e^{i\left(\frac{\alpha+\beta}{2} + \frac{\pi}{2}\right)}. \end{aligned}$$

**Q 6.** Écrire sous forme algébrique :  $(1 - 2i)^3 = \boxed{-11 + 2i}$ .

**Q 7.** Compléter ci-dessous la résolution dans  $\mathbb{C}$

$$2x^2 - (3+i)x + 2 = 0 \iff x = \boxed{1+i}$$

ou

$$x = \boxed{\frac{1}{2} + i \frac{1}{2}},$$

car le discriminant de  $2X^2 - (3+i)X + 2$  est

$$\Delta = \boxed{-8 + 6i} = \left( \boxed{1+3i} \right)^2.$$

### Une correction de l'exercice 1

[énoncé](#)

→ Le discriminant de cette équation est

$$\Delta = -8i = 4 \times (-2i) = 4 \times (1-i)^2 = (2(1-i))^2;$$

→ donc les solutions sont

$$\frac{-(-2i) - 2(1-i)}{2} = -1 + 2i, \text{ et } \frac{-(-2i) + 2(1-i)}{2} = 1.$$

### Une correction de l'exercice 2

[énoncé](#)

→ Le discriminant de cette équation est

$$\Delta = 8i = 4 \times (2i) = 4 \times (1+i)^2 = (2(1+i))^2;$$

## Colles de la semaine 4. Nom et prénom ?

→ donc les solutions sont

$$\frac{+(2+4i)-2(1+i)}{2} = i, \text{ et } \frac{+(2+4i)+2(1+i)}{2} = 2+3i.$$

### Une correction de l'exercice 3

énoncé

→ Le discriminant de cette équation est

$$\Delta = 12 - 16i = 4 \times (3 - 4i),$$

or  $(2-i)^2 = 3-4i$ , donc  $\Delta = (2(2-i))^2$  ;

→ donc les solutions sont

$$\frac{+(2+2i)-2(2-i)}{2} = -1+2i, \text{ et } \frac{+(2+2i)+2(2-i)}{2} = 3.$$

### Une correction de l'exercice 4

énoncé

Notons respectivement  $S_n$  et  $T_n$  ces deux sommes, alors

$$S_n + i T_n = \sum_{k=0}^n e^{i(a+k\theta)},$$

autrement dit  $S_n$  et  $T_n$  sont respectivement la partie réelle et la partie imaginaire de la somme  $\sum_{k=0}^n e^{i(a+k\theta)}$ .

Remarquons d'abord que si  $\theta$  est un multiple de  $2\pi$ , alors  $\cos(a+k\theta) = \cos(a)$  et  $\sin(a+k\theta) = \sin(a)$ , donc dans ce cas  $S_n = (n+1)\cos(a)$  et  $T_n = (n+1)\sin(a)$ .

Sinon,  $\theta$  n'est pas un multiple de  $2\pi$ , et par conséquent  $e^{i\theta}$  est différent de 1, ainsi

$$\begin{aligned}
 U_n &= \sum_{k=0}^n e^{ia} \times (e^{i\theta})^k = e^{ia} \sum_{k=0}^n (e^{i\theta})^k = e^{ia} \times \frac{1 - (e^{i\theta})^{n+1}}{1 - e^{i\theta}} \quad (\text{car } e^{i\theta} \neq 1) \\
 &= e^{ia} \times \frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}} \\
 &= e^{ia} \times \frac{e^{i(n+1)\frac{\theta}{2}} \left( e^{-i(n+1)\frac{\theta}{2}} - e^{i(n+1)\frac{\theta}{2}} \right)}{e^{i\frac{\theta}{2}} \left( e^{-i\frac{\theta}{2}} - e^{i\frac{\theta}{2}} \right)} \quad (\text{c'est l'« argument-moitié »}) \\
 &= e^{ia} \times \frac{e^{i(n+1)\frac{\theta}{2}} (-2i \sin(n+1)\frac{\theta}{2})}{e^{i\frac{\theta}{2}} (-2i \sin \frac{\theta}{2})} \\
 &= e^{i(a+(n+1)\frac{\theta}{2} - \frac{\theta}{2})} \times \frac{\sin(n+1)\frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}} = e^{i(a+n\frac{\theta}{2})} \times \frac{\sin(n+1)\frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}} \\
 &= \left( \cos(a + n\frac{\theta}{2}) + i \sin(a + n\frac{\theta}{2}) \right) \times \frac{\sin(n+1)\frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}
 \end{aligned}$$

donc  $S_n = \cos(a + n\frac{\theta}{2}) \times \frac{\sin(n+1)\frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}$  et  $T_n = \sin(a + n\frac{\theta}{2}) \times \frac{\sin(n+1)\frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}$ .

### Une correction de l'exercice 5

[énoncé](#)

Notons respectivement  $S_n$  et  $T_n$  ces deux sommes, alors  $S_n$  et  $T_n$  sont la partie réelle et la partie imaginaire de la somme  $U_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} e^{i(a+k\theta)}$ .

Or

$$\begin{aligned}
 U_n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} e^{ia} \times (e^{i\theta})^k = e^{ia} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (e^{i\theta})^k = e^{ia} \times (1 + e^{i\theta})^n \\
 &= e^{ia} \times \left( e^{i\frac{\theta}{2}} \left( e^{-i\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}} \right) \right)^n \quad (\text{avec l'« argument-moitié »}) \\
 &= e^{ia} \times e^{in\frac{\theta}{2}} \left( 2 \cos \left( \frac{\theta}{2} \right) \right)^n = e^{i(a+n\frac{\theta}{2})} 2^n \cos^n \frac{\theta}{2} \\
 &= \left( \cos \left( a + n\frac{\theta}{2} \right) + i \sin \left( a + n\frac{\theta}{2} \right) \right) 2^n \cos^n \left( \frac{\theta}{2} \right)
 \end{aligned}$$

donc  $S_n = 2^n \cos^n \left( \frac{\theta}{2} \right) \times \cos \left( a + n\frac{\theta}{2} \right)$  et  $T_n = 2^n \cos^n \left( \frac{\theta}{2} \right) \times \sin \left( a + n\frac{\theta}{2} \right)$ .

## Une correction de l'exercice 6

énoncé

Pour tout réel  $a$ ,

$$\begin{aligned}\cos(5a) &= \Re(\mathrm{e}^{i5a}) = \Re((\mathrm{e}^{ia})^5) = \Re((\cos(a) + i \sin(a))^5) \\&= \dots (\text{formule du binôme}) \dots \\&= \cos^5(a) - 10 \cos^3(a) \sin^2(a) + 5 \cos(a) \sin^4(a) \\&= \cos^5(a) - 10 \cos^3(a)(1 - \cos^2(a)) + 5 \cos(a)(1 - \cos^2(a))^2 \\&\quad (\text{avec } \sin^2 = 1 - \cos^2 \text{ et } \sin^4(a) = (\sin^2(a))^2) \\&= 16 \cos^5(a) - 20 \cos^3(a) + 5 \cos(a)\end{aligned}$$

Pour  $a = \frac{\pi}{10}$ , on obtient

$$\begin{aligned}\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) &= 0 \\&= 16 \left(\cos\frac{\pi}{10}\right)^5 - 20 \left(\cos\frac{\pi}{10}\right)^3 + 5 \left(\cos\frac{\pi}{10}\right),\end{aligned}$$

donc  $\left(\cos\frac{\pi}{10}\right)$  est une des solutions de l'équation  $16x^5 - 20x^3 + 5x = 0$ .  
Or

$$\begin{aligned}16x^5 - 20x^3 + 5x = 0 &\iff x = 0 \text{ ou } 16x^4 - 20x^2 + 5 = 0 \\&\iff x = 0 \text{ ou } 16(x^2)^2 - 20(x^2) + 5 = 0.\end{aligned}$$

Le discriminant de l'équation du second degré  $16y^2 - 20y + 5 = 0$  est

$$\Delta = 80 = (4\sqrt{5})^2$$

donc ses solutions sont

$$\frac{20 + 4\sqrt{5}}{2 \times 16} = \frac{5 + \sqrt{5}}{8} \text{ et } \frac{20 - 4\sqrt{5}}{2 \times 16} = \frac{5 - \sqrt{5}}{8}.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned}16x^5 - 20x^3 + 5x = 0 &\iff x = 0 \text{ ou } x^2 = \frac{5 + \sqrt{5}}{8} \\&\quad \text{ou } x^2 = \frac{5 - \sqrt{5}}{8} \text{ (et ces deux réels sont positifs)} \\&\iff x = 0 \text{ ou } x = \pm \sqrt{\frac{5 + \sqrt{5}}{8}} \text{ ou } x = \pm \sqrt{\frac{5 - \sqrt{5}}{8}}\end{aligned}$$

Les solutions de l'équation  $16x^5 - 20x^3 + 5x = 0$  sont donc, dans l'ordre croissant,

$$-\sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{8}} < -\sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}} < 0 < \sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}} < \sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{8}}$$

Nous devons déterminer laquelle de ces 5 solutions est  $\cos \frac{\pi}{10}$  (*sans calculatrice*). Tout d'abord,  $0 < \frac{\pi}{10} < \frac{\pi}{6} < \pi$ , et la fonction cosinus est décroissante sur  $[0, \pi]$ , donc  $\cos \frac{\pi}{10} > \cos \frac{\pi}{6}$ , autrement dit  $\cos \frac{\pi}{10} > \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

Or  $\sqrt{5} > 2$ , donc  $\frac{5-\sqrt{5}}{8} < \frac{3}{8}$  et du fait de la stricte croissance de  $x \mapsto \sqrt{x}$  sur  $[0; +\infty[$ , on déduit que

$$\sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{8}} < \sqrt{\frac{3}{8}} = \sqrt{\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}} = \sqrt{\frac{1}{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} < \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Ainsi les quatre premières solutions sont inférieures à  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ , elles sont donc écartées.

Il ne nous reste plus que la solution  $\sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{8}}$ , qui est donc la valeur recherchée :

$$\cos \frac{\pi}{10} = \sqrt{\frac{5+\sqrt{5}}{8}}.$$

### Une correction de l'exercice 7

[énoncé](#)

$$\begin{aligned} \cos^4(x) \times \sin(x) &= \left( \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^4 \times \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \\ &= \frac{1}{2^5 i} \left( e^{i4x} + 4e^{i2x} + 6 + 4e^{-i2x} + e^{-i4x} \right) \times (e^{ix} - e^{-ix}) \\ &= \frac{1}{2^5 i} \left( e^{i5x} + 3e^{i3x} + 2e^{ix} - 2e^{-ix} - 3e^{-i3x} - e^{-i5x} \right) \\ &= \frac{1}{2^5 i} \left( (e^{i5x} - e^{-i5x}) + 3(e^{i3x} - e^{-i3x}) + 2(e^{ix} - e^{-ix}) \right) \\ &= \frac{1}{2^5 i} (2i \sin(5x) + 3 \times 2i \sin(3x) + 2 \times 2i \sin(x)) \\ &= \frac{1}{16} \sin(5x) + \frac{3}{16} \sin(3x) + \frac{1}{8} \sin(x) \end{aligned}$$

## Colles de la semaine 4. Nom et prénom ?

### Une correction de l'exercice 8

énoncé

$$\begin{aligned}\sin(6x) &= \operatorname{Im}(\mathrm{e}^{i6x}) = \operatorname{Im}((\mathrm{e}^{ix})^6) \quad (\text{grâce à la formule de Moivre}) \\ &= \operatorname{Im}((\cos(x) + i \sin(x))^6) \\ &= \operatorname{Im}((\cos(x))^6 + 6(\cos(x))^5(i \sin(x)) + \\ &\quad 15(\cos(x))^4(i \sin(x))^2 + 20(\cos(x))^3(i \sin(x))^3 + \\ &\quad 15(\cos(x))^2(i \sin(x))^4 + 6(\cos(x))(i \sin(x))^5 + (i \sin(x))^6) \\ &= \operatorname{Im}(\cos^6(x) + i6 \cos^5(x) \sin(x) + \\ &\quad -15 \cos^4(x) \sin^2(x) - i20 \cos^3(x) \sin^3(x) + \\ &\quad +15 \cos^2(x) \sin^4(x) + i6 \cos(x) \sin^5(x) - \sin^6(x)) \\ &= 6 \cos^5(x) \sin(x) - 20 \cos^3(x) \sin^3(x) + 6 \cos(x) \sin^5(x)\end{aligned}$$

### Une correction de l'exercice 9

énoncé

Notons  $z = \frac{(c-b)(1+ab)}{b(1+ac)}$ .

Pour montrer que  $z$  est un imaginaire pur, il suffit de prouver que  $\bar{z} = -z$ . Or

$$\bar{z} = \overline{\left( \frac{(c-b)(1+ab)}{b(1+ac)} \right)} = \frac{(\bar{c}-\bar{b})(1+\bar{a} \times \bar{b})}{\bar{b}(1+\bar{a} \times \bar{c})} \quad (\text{car le conjugué d'une somme est la somme des conjugués, et le conjugué d'un produit est le produit des conjugués})$$

or  $a, b$  et  $c$  sont de module 1, donc  $|a|^2 = a \times \bar{a} = 1$ , ce qui donne  $\bar{a} = \frac{1}{a}$ . On a de même  $\bar{b} = \frac{1}{b}$  et  $\bar{c} = \frac{1}{c}$ , et par conséquent

$$\bar{z} = \frac{\left(\frac{1}{c} - \frac{1}{b}\right)\left(1 + \frac{1}{a} \times \frac{1}{b}\right)}{\frac{1}{b}\left(1 + \frac{1}{a} \times \frac{1}{c}\right)}.$$

En multipliant le numérateur et le dénominateur par  $bc \times ab$ , on obtient

$$\bar{z} = \frac{(b-c)(ab+1)}{b(ac+1)} = -\frac{(c-b)(1+ab)}{b(1+ac)} = -z \quad \text{C.Q.F.D.}$$

**Une correction de l'exercice 10****énoncé**

On demande d'établir une équivalence, ce que l'on fait en général en établissant l'une après l'autre les deux implications réciproques.

Je rappelle que pour prouver que  $(\mathcal{P}) \Rightarrow (\mathcal{Q})$ , on suppose que  $(\mathcal{P})$  est vraie, on met cette hypothèse dans la boîte à outils, et on montre  $(\mathcal{Q})$  en utilisant  $(\mathcal{P})$  au moment opportun.

- Supposons qu'il existe un réel  $a$  qui vérifie  $z = \frac{1+ia}{1-ia}$ . Alors

$$\boxed{|z|} = \left| \frac{1+ia}{1-ia} \right| = \frac{|1+ia|}{|1-ia|} = \frac{\sqrt{1^2 + a^2}}{\sqrt{1^2 + (-a)^2}} = \frac{\sqrt{1^2 + a^2}}{\sqrt{1^2 + a^2}} = \boxed{1} \text{ C.Q.F.D}$$

- Réciproquement, prenons  $z \in \mathbb{C} - \{-1\}$  qui vérifie  $|z| = 1$ , et montrons qu'il existe un réel  $a$  qui vérifie  $z = \frac{1+ia}{1-ia}$ .

**Méthode – l'analyse-synthèse :**

On peut envisager cet exercice comme la résolution dans  $\mathbb{R}$  de l'équation  $z = \frac{1+ia}{1-ia}$ , d'inconnue  $a$ .

Une méthode classique pour résoudre une équation est l'« analyse-synthèse » :

**l'analyse :** on suppose d'abord l'existence de solutions, et on tâche d'en déduire le plus d'informations possible sur ces solutions éventuelles (en quelque sorte un portrait-robot des solutions), voire dans le meilleur des cas d'en déduire carrément leurs valeurs ;

**la synthèse :** puis on cherche parmi les valeurs obtenues celles qui sont effectivement solutions.

Remarquons que la résolution classique

$$3x + 2 = 8 \iff 3x = 6 \iff x = 2$$

est l'analyse et la synthèse en même temps :

- $3x + 2 = 8 \implies 3x = 6 \implies x = 2$  est l'analyse ;
- $x = 2 \implies 3x = 6 \implies 3x + 2 = 8$  est la synthèse.

- Tout d'abord, cherchons  $a$  dans  $\mathbb{C}$  qui vérifie  $z = \frac{1+ia}{1-ia}$  (c'est la phase

d'analyse) :

$$\begin{aligned} z = \frac{1+ia}{1-ia} &\iff z(1-ia) = 1+ia \iff -i(1+z)a = 1-z \\ &\iff a = \frac{1-z}{-i(1+z)} \text{ (car } z \in \mathbb{C} - \{-1\} \text{ donc } 1+z \neq 0) \\ &\iff a = i \frac{1-z}{1+z} \text{ (en multipliant num. et dénom. par } i). \end{aligned}$$

donc il existe un unique nombre (a priori complexe)  $a$  qui vérifie  $z = \frac{1+ia}{1-ia}$ , ce nombre est  $a = i \frac{1-z}{1+z}$  (remarquons que ceci est vrai indépendamment de l'hypothèse  $|z| = 1$ .)

- (b) Montrons que ce nombre  $a$  est effectivement solution, autrement dit qu'il vérifie bien  $z = \frac{1+ia}{1-ia}$  (ce qui est immédiatement confirmé par les équivalences ci-dessus), et surtout il est réel (c'est cette propriété qui dépend de  $|z| = 1$ ) :



L'hypothèse  $|z| = 1$  peut être utilisée de plusieurs manières :

- ⇒ si  $|z| = 1$ , alors  $z$  peut s'écrire  $z = e^{i\theta}$ , où  $\theta \in \mathbb{R}$ ;
- ⇒ si  $|z| = 1$ , alors  $z$  peut s'écrire  $z = x + iy$ , où  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  et  $x^2 + y^2 = 1$ ;
- ⇒ si  $|z| = 1$ , alors  $|z|^2 = 1$ , donc  $z \times \bar{z} = 1$  donc  $\bar{z} = \frac{1}{z}$ .

D'autre part, pour montrer que  $a$  est un réel, on peut établir que  $\operatorname{Im}(a) = 0$ , ou que  $\bar{a} = a$ , ou encore que  $\bar{a} - a = 0$ .

Ce travail d'analyse des hypothèses et de la conclusion, pour savoir comment utiliser les premières, et comment établir la seconde, c'est ce qu'on appelle chercher un exercice de maths !

**Première méthode :** puisque  $|z| = 1$  et  $z \neq -1$ , alors il existe un réel  $\theta \in ]-\pi ; \pi[$  tel que  $z = e^{i\theta}$ . Ainsi le nombre  $a$  qui vérifie  $z = \frac{1+ia}{1-ia}$  est égal à

$$\begin{aligned} a &= i \frac{1-z}{1+z} = i \frac{1-e^{i\theta}}{1+e^{i\theta}} \\ &= i \frac{e^{i\theta/2}(e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2})}{e^{i\theta/2}(e^{-i\theta/2} + e^{i\theta/2})} \text{ (le fameux coup de « l'ar-} \\ &\quad \text{gument moitié »)} \\ &= i \frac{-2i \sin(\theta/2)}{2 \cos(\theta/2)} = \frac{\sin(\theta/2)}{\cos(\theta/2)} \\ &= \tan(\theta/2) \text{ qui est bien un réel, c.Q.F.D.} \end{aligned}$$

**Deuxième méthode :**

$$\begin{aligned}\bar{a} - a &= \overline{\left(i \frac{1-z}{1+z}\right)} - i \frac{1-z}{1+z} = -i \frac{1-\bar{z}}{1+\bar{z}} - i \frac{1-z}{1+z} \\&= -i \frac{(1-\bar{z})(1+z) + (1-z)(1+\bar{z})}{(1+\bar{z})(1+z)} \\&= -i \frac{1+z-\bar{z}-z \times \bar{z} + 1-z+\bar{z}-z \times \bar{z}}{(1+\bar{z})(1+z)}\end{aligned}$$

Or on a supposé que  $|z| = 1$ , donc  $z \times \bar{z} = 1$ , donc

$$\bar{a} - a = -i \frac{1+z-\bar{z}-1+1-z+\bar{z}-1}{(1+\bar{z})(1+z)} = 0$$

ce qui prouve que  $a$  est un réel, c.Q.F.D.

**Troisième méthode :** notons  $x$  la partie réelle de  $z$  et  $y$  sa partie imaginaire, alors en multipliant numérateur et dénominateur par le conjugué du second :

$$\begin{aligned}a &= i \frac{1-z}{1+z} = i \frac{1-x-iy}{1+x+iy} = i \frac{(1-x-iy)(1+x-iy)}{(1+x+iy)(1+x-iy)} \\&= i \frac{(1-x^2-y^2)+i(y(1-x)-y(1+x))}{(1+x)^2+y^2}\end{aligned}$$

mais on a supposé que  $|z| = 1$ , donc  $x^2 + y^2 = 1$ , d'où  $1 - x^2 - y^2 = 0$ , ce qui donne

$$a = i \frac{-i 2xy}{(1+x)^2+y^2} = \frac{2xy}{(1+x)^2+y^2}.$$

On peut donc conclure que  $a$  est un réel, c.Q.F.D.

**Une correction de l'exercice 11**

énoncé

- On utilise le fait que  $\omega^7 = e^{i2\pi} = 1$  :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^6 \omega^k &= \frac{1-\omega^7}{1-\omega} \quad (\text{car } \omega \neq 1) \\&= 0 \quad (\text{car } \omega^7 = 1)\end{aligned}$$

## Colles de la semaine 4. Nom et prénom ?



On vient de voir que  $\sum_{k=0}^6 \omega^k = 0$ , c'est-à-dire que

$$1 + e^{i2\pi/7} + e^{i4\pi/7} + \cdots + e^{i12\pi/7} = 0.$$

Pour pouvoir utiliser cette égalité, je vais modifier la quantité  $\cos(\frac{\pi}{7}) - \cos(\frac{2\pi}{7}) + \cos(\frac{3\pi}{7})$ , de façon à faire apparaître les exponentielles de mon outil.

$$\begin{aligned} & \cos(\frac{\pi}{7}) - \cos(\frac{2\pi}{7}) + \cos(\frac{3\pi}{7}) \\ &= \frac{e^{i\pi/7} + e^{-i\pi/7}}{2} - \frac{e^{i2\pi/7} + e^{-i2\pi/7}}{2} \\ &\quad + \frac{e^{i3\pi/7} + e^{-i3\pi/7}}{2} \quad (\text{avec la formule d'Euler}) \\ &= -\frac{1}{2}(-e^{i\pi/7} - e^{-i\pi/7} + e^{i2\pi/7} + e^{-i2\pi/7} - e^{i3\pi/7} - e^{-i3\pi/7}) \end{aligned}$$



On utilise à présent les transformations suivantes pour écrire de plusieurs façons différentes les exponentielles complexes :

$$-e^{i\theta} = e^{i\pi} \times e^{i\theta} = e^{i(\theta+\pi)} \text{ ou de même } -e^{i\theta} = e^{i(\theta-\pi)}$$

et aussi

$$e^{i\theta} = e^{i(\theta+2\pi)} = e^{i(\theta-2\pi)}$$

$$\boxed{\cos(\frac{\pi}{7}) - \cos(\frac{2\pi}{7}) + \cos(\frac{3\pi}{7})}$$

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{2}(e^{i(\pi/7+\pi)} + e^{-i(\pi/7+\pi)} + e^{i2\pi/7} + e^{i(-2\pi/7+2\pi)} + e^{i(3\pi/7+\pi)} + e^{i(-3\pi/7+\pi)}) \\ &= -\frac{1}{2}(e^{i8\pi/7} + e^{i6\pi/7} + e^{i2\pi/7} + e^{i12\pi/7} + e^{i10\pi/7} + e^{i4\pi/7}) \\ &= -\frac{1}{2}(-1 + (1 + e^{i2\pi/7} + e^{i4\pi/7} + e^{i6\pi/7} + e^{i8\pi/7} + e^{i10\pi/7} + e^{i12\pi/7})) \\ &= -\frac{1}{2}(-1 + 0) \quad (\text{d'après la première question}) \\ &= \boxed{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

**Une correction de l'exercice 12**

énoncé

1. Pour tout  $k \in \mathbb{Z}$ ,

$$\overline{\omega^k} = \overline{e^{ik\frac{2\pi}{7}}} = e^{-ik\frac{2\pi}{7}} = e^{i2\pi} \times e^{-ik\frac{2\pi}{7}} = e^{i(7\frac{2\pi}{7}-k\frac{2\pi}{7})} = e^{i(7-k)\frac{2\pi}{7}} = \omega^{7-k}.$$

Je vous laisse en déduire que  $\overline{S} = T$ .

D'autre part,  $\text{Im}(S) = \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{4\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{8\pi}{7}\right)$ .

Or  $\sin\left(\frac{8\pi}{7}\right) = -\sin\left(\frac{8\pi}{7} - \pi\right) = -\sin\left(\frac{\pi}{7}\right)$ , et  $0 < \frac{\pi}{7} < \frac{2\pi}{7} < \pi$ , donc  $\sin\left(\frac{\pi}{7}\right) < \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right)$  et

$$\sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{8\pi}{7}\right) = \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{7}\right) > 0$$

Et comme de plus  $0 < \frac{4\pi}{7} < \pi$ , on a  $\sin\left(\frac{4\pi}{7}\right) > 0$ , par conséquent

$$\text{Im}(S) = \left[ \sin\left(\frac{2\pi}{7}\right) + \sin\left(\frac{8\pi}{7}\right) \right] + \sin\left(\frac{4\pi}{7}\right) > 0.$$

2. L'équation  $Z^2 + Z + 2 = 0$  a pour discriminant  $-7 = (i\sqrt{7})^2$ , donc ses solutions sont  $\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}$  et  $\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}$ .

3.  $S + T = (\omega + \omega^2 + \omega^4) + (\omega^3 + \omega^5 + \omega^6) = \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^6 = \sum_{k=1}^6 \omega^k$

donc  $S + T = \sum_{k=0}^6 \omega^k - \omega^0 = \sum_{k=0}^6 \omega^k - 1$ ,

or  $\omega \neq 1$  et  $\omega^7 = (e^{i\frac{2\pi}{7}})^7 = e^{i2\pi} = 1$ , donc  $\sum_{k=0}^6 \omega^k = \frac{1-\omega^7}{1-\omega} = 0$ , d'où

$$S + T = -1.$$

$$S \times T = (\omega + \omega^2 + \omega^4) \times (\omega^3 + \omega^5 + \omega^6) = \omega^4 + \omega^6 + \omega^7 + \omega^5 + \omega^7 + \omega^8 + \omega^7 + \omega^9 + \omega^{10},$$

or  $\omega^7 = 1$ ,  $\omega^8 = \omega^7 \times \omega = \omega$ , et de même  $\omega^9 = \omega^2$ ,  $\omega^{10} = \omega^3$ , ainsi

$$ST = 2 + \underbrace{(1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 + \omega^5 + \omega^6)}_{=0} = 2$$

Deux nombres  $a$  et  $b$  sont toujours les racines du polynôme  $X^2 - (a+b)X + ab$ , ainsi des égalités  $S + T = -1$  et  $ST = 2$ , on déduit que  $S$  et  $T$  sont les racines du polynôme  $X^2 + X + 2$ , c'est-à-dire la question (b) :  $\frac{-1+i\sqrt{7}}{2}$  et  $\frac{-1-i\sqrt{7}}{2}$ .

## Colles de la semaine 4. Nom et prénom ?

Comme on sait que  $\operatorname{Im}(S) > 0$ , on peut donc conclure que

$$S = \frac{-1 + i\sqrt{7}}{2} \text{ et } T = \frac{-1 - i\sqrt{7}}{2}$$

et non l'inverse.

### Une correction de l'exercice 13

énoncé

- Pour tout  $Z \in \mathbb{C}$ ,

$$Z^4 + Z^3 + Z^2 + Z + 1 = 0 \iff \begin{cases} \frac{1-Z^5}{1-Z} = 0 \\ Z \neq 1 \end{cases} \iff Z^5 = 1 \text{ et } Z \neq 1$$

donc comme 1 n'est évidemment pas solution de l'équation, on conclut que

$$Z^4 + Z^3 + Z^2 + Z + 1 = 0 \iff \exists k \in \{1, 2, 3, 4\}, \quad Z = e^{i \frac{2\pi}{5} k}.$$

- On en déduit que pour tout nombre complexe  $z$

$$\begin{aligned} & \left( \frac{z+i}{z-i} \right)^4 - \left( \frac{z+i}{z-i} \right)^3 + \left( \frac{z+i}{z-i} \right)^2 - \left( \frac{z+i}{z-i} \right) + 1 = 0 \\ \iff & \left( -\frac{z+i}{z-i} \right)^4 + \left( -\frac{z+i}{z-i} \right)^3 + \left( -\frac{z+i}{z-i} \right)^2 + \left( -\frac{z+i}{z-i} \right) + 1 = 0 \\ \iff & \exists k \in \{1, 2, 3, 4\}, \quad -\frac{z+i}{z-i} = e^{i \frac{2\pi}{5} k} \quad (\text{ce qui fait 4 équations à résoudre}) \\ \iff & \exists k \in \{1, 2, 3, 4\}, \quad -\left( 1 + e^{ik \frac{2\pi}{5}} \right) z = i \left( 1 - e^{ik \frac{2\pi}{5}} \right) \\ \iff & \exists k \in \{1, 2, 3, 4\}, \quad z = -i \frac{1 - e^{ik \frac{2\pi}{5}}}{1 + e^{ik \frac{2\pi}{5}}} \quad (\text{car } e^{ik \frac{2\pi}{5}} \neq 1) \\ \iff & \exists k \in \{1, 2, 3, 4\}, \quad z = -i \frac{e^{ik \frac{\pi}{5}} (e^{-ik \frac{\pi}{5}} - e^{ik \frac{\pi}{5}})}{e^{ik \frac{\pi}{5}} (e^{-ik \frac{\pi}{5}} + e^{ik \frac{\pi}{5}})} = -i \times \frac{-2i \sin(k \frac{\pi}{5})}{2 \cos(k \frac{\pi}{5})} \\ & \qquad \qquad \qquad = -2 \tan\left(k \frac{\pi}{5}\right). \end{aligned}$$

Donc l'ensemble des solutions de l'équation est

$$\left\{ -2 \tan\left(k \frac{\pi}{5}\right) \mid k \in \{1, 2, 3, 4\} \right\}.$$